



LARVAMAX

LARVAMAX de HESTIA-G, es un alimento que combina una fórmula eficiente, con materias primas cuidadosamente seleccionadas, producto de un completo estudio y análisis de las necesidades nutricionales en la alimentación de camarón en etapa de crecimiento.

■ INGREDIENTES

Pasta de soya, Harina de pescado, Harina de trigo, Aceite de pescado, Soluble hidrolizado de pescado, Pared de levadura (*Saccharomyces cerevisiae*), Premezcla de fitobióticos (Taninos condensados y solubles de Quebracho y Castañas, Mono glicéridos de ácido butírico, ácidos húmicos, almidón de papa, aceites de orégano, timol, canela y clavo de olor, tierra de diatomeas, nuez de *Sapindus Mukorossi* en polvo), Acidificante acuicola (ajo, orégano, ácido ascórbico, ají, ácido cítrico, jengibre), Fosfato de calcio (E341ii), Óxido de hierro (E172), Premezcla de vitaminas y minerales (Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina B3, Vitamina H, Vitamina B5, Glicerofosfato de Calcio, Glicerofosfato de Magnesio, Glicerofosfato de potasio, Glicerofosfato de sodio, Excipiente c.s.p.), Polimetil carbamida (E927b).

■ ANIMAL DE DESTINO

Camarones desde Postlarva 1 a 20.

■ PRESENTACIÓN:

Funda de polietileno de 20 kg.

Diámetro del producto: 150, 300 y 500 micras.

■ ANÁLISIS GARANTIZADOS

PROTEÍNA	MÍN. 42%
GRASA	MÍN. 5%
FIBRA	MÁX. 5%
CENIZA	MÁX. 12%
HUMEDAD	MÁX. 11%

■ ALIMENTACIÓN SUGERIDA POR LARVA

PL 1 A 6	LARVAMAX 150 µ
PL 7 A 12	LARVAMAX 300 µ
PL 13 A 20	LARVAMAX 500 µ

■ RECOMENDACIÓN DE USO

Se recomienda aplicar en las siguientes dosis diarias divididas y aplicadas de 2 a 3 veces al día, mezcladas con el alimento balanceado.

ETAPA	DOSIS AL DÍA (gramos/millón)
PL 1	45
PL 2	60
PL 3	75
PL 4	90
PL 5	135
PL 6	150
PL 7	165
PL 8	180
PL 9	195
PL 10	210
PL 11	240
PL 12	270
PL 13	300
PL 14	330
PL 15	360
PL 16	390
PL 17	420
PL 18	450
PL 19	480
PL 20	510

■ USO DEL PRODUCTO

Producto veterinario de uso acuicola. Suplemento alimenticio de alta digestibilidad que puede ser usado en combinación con el alimento balanceado en el estadio de postlarvas de camarón.

■ ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado alejado de la exposición al sol. No requiere condiciones especiales de transporte.

■ CADUCIDAD: 6 meses